

**Handläggare**

Ulrika Bengtsson (ubd002)

**Fastställare**

Åsa Bellander (abr013)

**Gäller för**

Regiongemensamt

**Dokumenttyp**

Riktlinje

**Giltigt till och med**

2023-05-29

**Granskare**

Maria Tempé (mte001)

**Fastställt**

2021-09-08

**Reviderat**

2021-11-29

**Dokumentnr / Version**

592582 / Version 5

**Processägare****Ytterligare information**

Giltig från och med 2021-11-22

Tillägg 2021-11-29 \*vid screening- inresa i Sverige

## Provtagningsindikation PCR-test för covid-19

Indikationen avser provtagning för pågående covid-19-infektion och analys med PCR-metodik för påvisning av viruset SARS-CoV-2. Indikationen är en regional anpassning av Folkhälsomyndighetens nationella

[Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19.](#)

Provtagning rekommenderas:

- Vid symtom på covid-19 hos person från förskoleklass och äldre, oavsett vaccinationsstatus.
- Vid smittspårning, se Folkhälsomyndighetens [Vägledning för smittspårning av covid-19](#) och de regionala styrdokumenterna [Riktlinje för screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg för äldre](#) respektive [Riktlinje för screening och smittspårning av covid-19 inom RVN och för privata vårdgivare](#) för detaljer.
- Vid screening
  - vid inresa i Sverige enligt Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer, se <https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/rekommendationer-till-dig-som-reser-in-i-sverige/>
  - inför inskrivning i omsorgsboende eller slutenvård enligt de regionala styrdokumenterna [Riktlinje för screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg för äldre](#) respektive [Riktlinje för screening och smittspårning av covid-19 inom RVN och för privata vårdgivare](#). Observera att **antigentester** företrädesvis används i Region Västernorrland för screening av personer utan symtom i dessa situationer.

Efter genomgången infektion med covid-19 är förnyad provtagning inom sex månader från infektionstillfället i allmänhet inte indikerad, men kan göras om särskilda skäl föreligger utifrån individuell bedömning av behandlande läkare.

Dokumenttyp	Fastställt	Reviderat	Giltigt till och med	Dokumentnr / Version
Riktlinje	2021-09-08	2021-11-29	2023-05-29	592582 / Version 5

## Förklaring av begrepp

**Symtom** som beskrivits för covid-19 (listan är inte uttömmande):

Feber, hosta, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk, diarré, förlust av lukt- och smaksinne.

**Vaccinerad** är den som fått minst två vaccindoser av Comirnaty, Spikevax, Vaxzevira eller annat av WHO godkänt vaccin och minst två veckor har förflutit sedan andra dosen gavs. Personer som fått Covid-19 Vaccine Jansen räknas som vaccinerade två veckor efter den första dosen.

**Genomgången infektion med covid-19** definieras som en bekräftad covid-19-infektion med ett positivt PCR-test, alternativt ett positivt antigen test utfört inom hälso- och sjukvården vid förekomst av symtom eller vid smittspårning i egenskap av hushållskontakt till ett bekräftat fall av covid-19.

Se [Falldefinition vid anmälan enligt smittskyddslagen av covid-19](#) för ytterligare information.

## Relaterad information

[Falldefinition vid anmälan enligt smittskyddslagen av covid-19 FOHM](#)

[Provtagning covid-19 RVN](#)

[Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19 FOHM](#)

[Smittspårning covid-19 RVN](#)

[Vägledning för smittspårning av covid-19 FOHM](#)