

Lathund smittsamhetsbedömning vid covid-19

Tabell: Övergripande rekommendationer om tidsperioder för smittsamhet.

Kategori av fall med covid-19	Bedöms ha låg smittsamhet efter	Förutsättning
Personer i samhället med bekräftad infektion, med eller utan symtom	5 dagar eller mer sedan symtomdebut eller provtagningsdag vid symtomfri infektion	Mer än 1 dygns feberfrihet och påtaglig allmän förbättring
Vård och omsorgspersonal, med eller utan symtom	5 dagar eller mer sedan symtomdebut eller provtagningsdag vid symtomfri infektion	Mer än 1 dygns feberfrihet och påtaglig allmän förbättring
Omsorgstagare på särskilt boende för äldre eller andra omsorgsverksamheter där personer med hög risk för allvarlig sjukdom i covid-19 vistas. Gäller även personer som vårdats på sjukhus och skrivs ut till denna typ av boende	7 dagar eller mer sedan symtomdebut eller provtagningsdag vid symtomfri infektion	Mer än 1 dygns feberfrihet och påtaglig allmän förbättring
Sjukhusvårdade av annan orsak och där covid-19 diagnosen är ett bifynd	7 dagar eller mer sedan symtomdebut eller provtagningsdag vid symtomfri infektion	Mer än 1 dygns feberfrihet och stabil klinisk förbättring
Sjukhusvårdade p.g.a. covid-19 som kanske behövt syrgas men inte vård på IVA	7 dagar eller mer sedan symtomdebut. Individuell bedömning kan behövas utgående från sjukdomens allvarlighetsgrad, patientens immunstatus samt konsekvenser vid smitta i den miljö som personen vistas i	Mer än 1 dygns feberfrihet och stabil klinisk förbättring
Sjukhusvårdade p.g.a. covid-19 med svårare sjukdomsbild inklusive behov av IVA-vård	Alltid individuell bedömning , men som regel mer än 1 dygns feberfrihet och stabil klinisk förbättring och minst 14 dagar sedan symtomdebut	
Immunsupprimerade p.g.a. annan sjukdom eller behandling, exempelvis: - hematologisk malignitet - känd immunbristsjukdom - stamcellstransplantation de senaste 24 månaderna - organtransplantation de senaste 6 månaderna - läkemedelsbehandling såsom immunmodulerande biologiska läkemedel - cytostatika - steroider i hög dos under längre tid	Alltid individuell bedömning , men som regel mer än 1 dygns feberfrihet och stabil klinisk förbättring och minst 14 dagar sedan symtomdebut eller provtagningsdag vid symtomfri infektion	

Källa: [Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen \(slf.se\)](#) Covid-19, läkarinformation 2022-11-10 och <https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/f/forebyggande-atgarder-och-rekommendationer-kring-smittsparning-av-covid-19-inom-varld-och-omsorg/>