Region Västernorrland

Smittskyddsläkaren
2025-11-25
Dnr 2025-82

Lathund för smittsamhetsbedömning inom vård och omsorg

Covid-19

Typ av patient	Låg smittsamhet
Ingen immunsuppression	Samtliga tre kriterier uppfyllda: • feberfrihet i minst 1 dygn **och** • klinisk förbättring **och** • minst 5 dygn efter symtomdebut
Immunsuppression *eller* Kritisk sjukdom som vårdats på IVA	**Alltid individuell bedömning!** Riktmärke för låg smittsamhet, samtliga tre kriterier uppfyllda: • feberfrihet i minst 1 dygn **och** • stabil klinisk förbättring **och** • minst 14 dygn efter symtomdebut
Inga symtom	5 dygn efter provtagningsdatum

Influensa A och B

Typ av patient	Låg smittsamhet
Ingen immunsuppression	Samtliga tre kriterier uppfyllda: • feberfrihet i minst 1 dygn **och** • klinisk förbättring **och** • minst 5 dygn efter symtomdebut
Immunsuppression	**Alltid individuell bedömning!**
Inga symtom	5 dygn efter provtagningsdatum
Antiviral behandling mot influensa	Båda kriterier uppfyllda: • behandlingen pågått i minst 3 dygn **och** • stabil klinisk förbättring under minst 1 dygn

RS-virus

Typ av patient	Låg smittsamhet
Vuxen utan immunsuppression	Samtliga tre kriterier uppfyllda: • feberfrihet i minst 1 dygn **och** • klinisk förbättring **och** • minst 5 dygn efter symtomdebut
Immunsuppression	Smittförebyggande åtgärder under hela sjukhusvistelsen
Barn	Smittförebyggande åtgärder under hela sjukhusvistelsen
Inga symtom	5 dygn efter provtagningsdatum

Se även vårdhygienisk riktlinje Luftvägsinfektioner