



Screening av barn yngre än 2 år från högriskland* eller riskmiljö för TBC



*Länder med hög risk, se tabell 2 i Folkhälsomyndighetens "[Riskländer för tuberkulos](#)"


Screening med IGRA av barn 2-5 år från högriskland* eller riskmiljö för TBC



*Länder med hög risk, se tabell 2 i Folkhälsomyndighetens "[Riskländer för tuberkulos](#)"


**Om IGRA inte kan utföras är PPD ett alternativ. Se separat schema i bilaga 1c

Screening med **PPD** av barn 2-5 år från högriskland* eller riskmiljö för TBC



*Länder med hög risk, se tabell 2 i Folkhälsomyndighetens "[Riskländer för tuberkulos](#)"

Screening av barn ≥ 6 år och vuxna ≤ 35 år från högriskland* eller riskmiljö för TBC




*Länder med hög risk, se tabell 2 i Folkhälsomyndighetens "[Riskländer för tuberkulos](#)"

Screening av vuxen > 35 år från högriskland* eller riskmiljö för TBC

** Riskfaktorer för utveckling av aktiv tuberkulos

- Graviditet/postpartum
- Bakomliggande sjukdom:
 - Hiv
 - Lymfom
 - Leukemi
 - Annan aktiv malign sjukdom
 - Immunsupprimerande behandling
 - Organtransplantation
 - Insulinbehandlad diabetes
 - Kronisk njursvikt/hemodialys
 - Grav undervikt
 - Gastrectomi, jejunio-ileal bypass
 - Silikos
- Känd exponering senaste 2 åren



*Länder med hög risk, se tabell 2 i Folkhälsomyndighetens "Riskländer för tuberkulos"