

**Handläggare**

Anna-Maria Söderström (asm014)

**Fastställare**

Anna-Lena Lundberg (blg010)

**Gäller för**

Närsjukvårdsområde Norr

Närsjukvårdsområde Söder

Närsjukvårdsområde Väster

Länssjukvårdsområde somatik

Länssjukvårdsområde psykiatri och habilitering

**Dokumenttyp**

Rutin/Regel

**Giltigt till och med**

2022-09-24

**Fastställt**

2021-03-24

**Reviderat**

2021-03-24

**Granskare**

Maria Alsén Lindström (man021)

**Dokumentnr / Version**

560687 / Version 1

**Processägare**

Hans Boman (hbn007)

**Ytterligare information**Utarbetat av medicinska gruppen i  
projekt vaccination covid-19

## Covid-19 - Antikoagulantibehandling vid vaccination mot covid-19

Vaccin mot covid-19 ska ges intramuskulärt. Vid intramuskulär injektion hos patienter som behandlas med antikoagulantia finns viss risk för muskelblödning. Låt patienten trycka på vaccinationspunkten 2–3 minuter efter vaccinationen.

### För patient med Waran eller Warfarin

- Patienter med stabila PK-INR (kontrollintervall 4 veckor och längre) kan vaccineras utan särskild kontroll.
- Patienter med kontrollintervall kortare än fyra veckor meddelar vaccinationsdatum till AK-mottagningen för kontroll av PK-INR värdet på samma sätt som rutin vid planeringen för andra ingrepp.
- Patienter som kombinationsbehandlas med Waran eller Warfarin och trombocythämmare (exempel acetylsalicylsyra, klopidogrel, tikagrelor) meddelar vaccinationsdatum till AK-mottagningen för kontroll av PK-INR värdet på samma sätt som rutin vid planeringen för andra ingrepp.

### För patient med Eliquis och Pradaxa

- Hoppa över morgondosen antikoagulantia vaccinationsdagen och ta kvällsdosen minst 2 timmar efter vaccinationen.

### För patient med Lixiana, Xarelto eller lågmolekylärt heparin

- Ta tabletten/injektionen antikoagulantia 2 timmar efter vaccination.

### För patient med trombocythämmare (exempel acetylsalicylsyra, klopidogrel, tikagrelor) men inte i kombination med Waran eller Warfarin

- Ta tabletterna som vanligt oavsett tidpunkt för vaccination.

*Om patient som kommer för vaccination har tagit sin morgontablett, ombokas den till samma dags eftermiddag vid 16.00-18.00.*

*Om patienten står på antikoagulantia i två-dos, uppmana patienten att ta sin kvällsdos som vanligt men inte tidigare än klockan 20.00.*

**Dokumenttyp**  
Rutin/Regel**Fastställt**  
2021-03-24**Reviderat**  
2021-03-24**Giltigt till och med**  
2022-09-24**Dokumentnr / Version**  
560687 / Version 1

## Relaterad information

[Patientinformation - Behandling med blodförtunnande läkemedel vid vaccination](#)