

Preparat

			Obero-ende av måltid			Anta-cida		Fe, Ca, Mg	Delbar-het	Intas stående eller sittande
Amoxicillin			✓						(X)	
Amoxicillin + klavulansyra	✓								D	
Atovakvon	✓								-	
Azitromycin			✓			✓			FASS	
Cefadroxil	✓								FASS	
Ceftibuten (licens)		✓							(X)	
Ciprofloxacin			✓		✓	✓	✓		(X)	
Doxycyklin	✓			✓	✓	✓	✓		D	S
Doxycyklin (Oracea)		✓		✓	✓	✓	✓		X	S
Erytromycin	✓								(X)	
Etambutol			✓				✓			
Fenoximetylpenicillin	Barn	Vuxna							D	
Flukloxacillin		✓								1/2 Ej 125 mg
Flukonazol			✓						(X)	
Fusidinsyra		✓		✓					X	
Itrakonazol									X	
Isoniazid (Tibinide)	Efter måltid	✓		✓		✓	✓		D	
Klaritromycin			✓						X	



Tas med måltid



1 tim före eller 2 tim efter måltid



Alkohol ska undvikas



Risk för fotosensibilisering

✗ Antacida ska undvikas under behandlings-tiden.

✗ Fe, Ca, Mg ska undvikas under behandlings-tiden. Mejeriprodukter ska inte intas samtidigt.

Delbarhet och övrig information

Antibiotika ska i möjligaste mån aldrig delas eller krossas.

1/2 kan delas i två lika stora doser.

D kan delas för nedsväljning.

(X) preparat bör sväljas hela.

X får inte delas.

FASS se fass, beror på tillverkare.

S anger att läkemedlet ej ska intas i liggande ställning.

Preparat

			Oberoende av måltid				Anta- cida		Fe, Ca, Mg	Delbar- het	Intas stående eller sittande
Kindamycin			✓							X	S
Levofloxacin			✓		✓	✓		✓		1/2	
Linezolid			✓	✓						FASS	
Lymecyklin	✓				✓	✓	✓	✓		X	S
Metenamin			✓				✓			D	
Metronidazol			✓	✓						(X)	
Moxifloxacin			✓		✓	✓	✓	✓		X	
Nitrofurantoin	✓									D	
Nystatin			✓								
Pivmecillinam				✓						(X)	
Posakonazol				✓						X	
Rifampicin		✓			✓		✓			X	
Rifaximin				✓						X	
Sulfametoxazol + trimetoprim	✓									D	
Tetracyklin			✓			✓	✓	✓		X	S
Trimetoprim					✓					D	
Vankomycin					✓					X	
Vorikonazol		✓				✓				X	



Tas med måltid



1 tim före eller 2 tim efter måltid



Alkohol ska undvikas



Risk för fotosensibilisering

Antacida ska undvikas under behandlings-tiden.

Fe, Ca, Mg ska undvikas under behandlings-tiden. Mejeriprodukter ska inte intas samtidigt.

Delbarhet och övrig information

Antibiotika ska i möjligaste mån aldrig delas eller krossas.

1/2 kan delas i två lika stora doser.

D kan delas för nedsväljning.

(X) preparat bör sväljas hela.

X får inte delas.

FASS se fass, beror på tillverkare.

S anger att läkemedlet ej ska intas i liggande ställning.