

Handläggare

Maria Alsén Lindström (man021)

Fastställare

Maria Strandberg (msg003)

Gäller för

Närsjukvårdsområde Norr
Närsjukvårdsområde Söder
Närsjukvårdsområde Väster
Länssjukvårdsområde somatik
Länssjukvårdsområde psykiatri och habilitering
RPK sluten- och öppenvårdskliniken
Privata vårdgivare

Dokumenttyp

Riktlinje

Fastställt

Giltigt till och med

Reviderat

Dokumentnr / Version

453478 / Version A.K.

Processägare**Granskare**

Ulrika Edström (usm007), Oxana Thörnberg (otg001), Zeb Freij (zff002), Kajsa-Stina Wiklund (ksn019), Johan Gudmundson (jgn015)

Ytterligare information

Naloxon i nässpray till personer med risk för överdos av opioider

Bakgrund

Naloxon är ett läkemedel effektivt häver effekten av opioider vid livshotande opioidförgiftning (överdos). Naloxon kan vara en livräddande åtgärd om det används i direkt anslutning till en överdos. Naloxon har hittills varit avsett att administreras som en del av en återupplivning vid fall av misstänkt överdos av opioider, och användningen av läkemedlet är väletablerad i akutsjukvården. Naloxon används således inte för att behandla ett beroendetillstånd, utan för att häva en överdos.

Naloxon kan förskrivas av sjuksköterska (HSLF-FS 2018:43) eller läkare och även delas ut vid förskrivningstillfället (HSLF-FS 2016:34). I ”Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk, uppdaterad 2019” från Socialstyrelsen står:

Rekommendation*Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör*

- erbjuda naloxon och utbildningsinsats till personer med opioidberoende och risk för överdos (*prioritet 1*).

95% av narkotikadödligheten är opioidorsakad och skulle kunna undvikas om det funnits tillgång till antidot och kunskap hur den ska användas.

Hur gör man praktiskt?

Opioidintoxikerad patient på sjukhus	Patient som själv önskar naloxon
* Samtal med läkare om möjligheter till hjälp att avsluta missbruk * Erbjud naloxon nässpray gratis vid utskrivning/hemgång	* Läkarpbesök med inventering av missbruk * Råd kring nedtrappning/avsluta missbruk * Erbjud naloxon nässpray gratis
* Informera att effekten av naloxon sitter i trettio minuter – därefter kan personen bli medvetslös igen. * 112 ska alltid larmas om man använt naloxon	
* Skriv ut informationsfolder från Socialstyrelsen till patienten	

Ordinationen av naloxon dokumenteras som ordination vid behov i Cosmics läkemedelsmodul. Ordinationsmall finns. I det ordinationen skrivs utgångsdatum för utlämnat naloxon nässpray samt läggs in som utsättningsdatum. Vid nästkommande kontakter med vården kontrolleras så inte ”bäst-före-datum” passerats och patienten behöver få en ny förpackning.

De vårdenheter som förväntas kunna träffa patienter med ett opioidmissbruk rekviderar naloxon nässpray (Respinal) från sjukhusapoteket enligt standardförfarande. Enheter som kan vara aktuella finns både inom somatisk och psykiatrisk sjukhusvård och primärvård.

Relaterad information

[Socialstyrelsen: Affisch Rädda liv med naloxon-nässprej som kan häva en opioidöverdos](#)