

Användningstider för läkemedel i bruten förpackning

Användningstider för läkemedel i bruten förpackning

Angiven användningstid gäller under förutsättning att tillverkaren inte angivit kortare hållbarhetstid på förpackning, i FASS eller bipacksedel. *Kom ihåg att alltid anteckna brytningsdatum på förpackningen.* Det är viktigt att uttag görs ur förpackningen på ett sätt som förhindrar kontamination av innehållet. Förteckningen nedan är baserad på Svensk läkemedelsstandard 2023.2 (SLS).

Läkemedelsform	Användning/Egenskaper	Begränsning/användningstid
Infusionsvätska med spädning och/eller tillsats	Administreras direkt	Maximal administreringstid vid rumstemperatur, 12 timmar
Spolvätskor	Vid kirurgi	Omedelbar användning
	Annan användning	24 timmar
Injektionsläkemedel UTAN ytterligare hantering utöver att sätta på kanyl eller ta av kanylskydd	Okonserverade	Omedelbar användning
Injektionsläkemedel MED ytterligare iordningsställande/ tillverkning som till exempel spädning	Okonserverade	12 timmar vid rumstemperatur eller 24 timmar i 2–8°C
	Konserverade	Flera patienter: 7 dagar *
		Enskild patient: 28 dagar *
Ögondroppar och ögonsalvor	Vid kirurgi	Omedelbar användning
	Okonserverade	Omedelbar användning *
	Konserverade	Flera patienter: 7 dagar *
		Enskild patient: 28 dagar *
Örondroppar	Vid kirurgi eller när trumhinnan är skadad	Omedelbar användning
Näsdroppar och nässprayer som är vattenbaserade	-	Endast till en patient. En behandlingsperiod. Okonserverade beredningar används dock längst 10 dagar.
Flytande läkemedel för in- eller utvärtes bruk	Konserverade	6 månader
	Konserverade, till infektionskänsliga patienter, tex. neutropena patienter och prematura barn	1 månad
	Konserverade, till sårvård	1 månad
	Okonserverade	1 vecka kallt
Krämer, salvor, geler för utvärtes bruk	Sterila salvor till stora öppna sår eller allvarligt skadad hud	Som för ögonsalvor
	Konserverade	6 månader
	Okonserverade	1 vecka, kylskåpsförvaring
Desinfektionsmedel	Alkoholbaserade (ex. Klorhexidinsprit)	1 månad till flera patienter
	Vattenbaserade (ex. Klorhexidinlös.)	1 vecka till flera patienter
Glidslem för kateterisering och liknande beredningar	Okonserverade	1 vecka kallt

*Riskbaserad bedömning beroende på antal punktioner eller administreringstillfällen