

Handläggare

Ida Eliasson Viklund (ivd005)

Fastställare

Åsa Bellander (abr013)

Gäller för

Specialistvården Västernorrland

Primärvården

Privata vårdgivare

Dokumenttyp

Riktlinje

Giltigt till och med

2024-03-28

Fastställt

2020-01-26

Reviderat

2022-03-28

Dokumentnr / Version

453478 / Version 2

Processägare**Granskare**

Maria Alsén Lindström (man021), Ulrika Edström (usm007), Maria Cajmatz (fcz001), Oxana Thörnberg (otg001)

Ytterligare information

Naloxon i nässpray till personer med risk för överdos av opioider

Bakgrund

Naloxon är ett läkemedel effektivt häver effekten av opioider vid livshotande opioidförgiftning (överdos). Naloxon kan vara en livräddande åtgärd om det används i direkt anslutning till en överdos. Naloxon har hittills varit avsett att administreras som en del av en återupplivning vid fall av misstänkt överdos av opioider, och användningen av läkemedlet är väletablerad i akutsjukvården. Naloxon används således inte för att behandla ett beroendetillstånd, utan för att häva en överdos. Läkemedlet kan förskrivas av sjuksköterska (HSLF-FS 2018:43) eller läkare och även delas ut vid förskrivningstillfället (HSLF-FS 2016:34). I "Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk, uppdaterad 2019" från Socialstyrelsen står:

Rekommendation

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör

- erbjuda naloxon och utbildningsinsats till personer med opioidberoende och risk för överdos (*prioritet 1*).

Den narkotikarelaterade dödligheten i Västernorrland är högre än riket i stort med drygt 15 dödsfall/100 000 invånare och år, de flesta relativt unga. 95% av narkotikadödligheten är opioidorsakad och skulle kunna undvikits om det funnits tillgång till antidot och kunskap hur den ska användas.

Rutin

De vårdenheter som förväntas kunna träffa patienter med ett opioidmissbruk rekviderar naloxon nässpray (Nyxoid) från sjukhusapoteket enligt standardförfarande. När faktura kommer skickas denna vidare till läkemedelsenheten som tar hela kostnaden. Enheter som kan vara aktuella finns både inom somatisk och psykiatrisk sjukhusvård och primärvård.



Dokumenttyp
Riktlinje

Fastställt
2020-01-26

Reviderat
2022-03-28

Giltigt till och med
2024-03-28

Dokumentnr / Version
453478 / Version 2

Opioidintoxikerad patient på sjukhus	Patient som själv önskar naloxon
<ul style="list-style-type: none">* Samtal med läkare om möjligheter till hjälp att avsluta missbruk* Erbjud naloxon nässpray gratis vid utskrivning/hemgång	<ul style="list-style-type: none">* Läkarbesök med inventering av missbruk* Råd kring nedtrappning/avsluta missbruk* Erbjud naloxon nässpray gratis
<ul style="list-style-type: none">* Informera att effekten av naloxon sitter i trettio minuter – därefter kan personen bli medvetlös igen.* 112 ska alltid larmas om man använt naloxon	
<ul style="list-style-type: none">* Skriv ut informationsfolder från Socialstyrelsen till patienten	

Ordinationen av naloxon dokumenteras som ett registrerat recept i NCSscross läkemedelsmodul. Receptfavorit finns: §nal+tab. I det registrerade receptet skrivs även utgångsdatum för utlämnat naloxon nässpray samt läggs in som utsättningsdatum. Vid nästkommande kontakter med vården kontrolleras så inte ”bäst-före-datum” passerats och patienten behöver få en ny förpackning.

Finansiering

Kostnaden för en förpackning naloxon nässpray (Nyxoid) är 283 kr i januari 2022. Under 2021 beställdes 9 förpackningar totalt till olika enheter i Västernorrland. Även med en fullt utbyggd rutin är det svårt att uppskatta att fler än 300 doser kommer delas ut per år till en total kostnad av cirka 90 000 kr. Troligtvis är inte personer med risk för överdos av opioider jämnt fördelade över länet varför kostnaderna läggs centralt.

Uppföljning

Antal utdelade förpackningar och kostnader för naloxon kommer följas kvartalsvis. I dödsorsaksstatistiken kommer vi förhoppningsvis se en minskning av opioidrelaterade dödsfall.

Relaterad information

[Lär dig rädda liv med naloxon](#)
[Patientinformation, fickfolder, så använder du naloxon](#)